DAIMETON T POLVO

Biovet Perú

Polvo Soluble





Composición

Sulfamonometoxina 80 g
Trimetoprim 20 g

Indicaciones

Bovinos: Colibacilosis (E. coli); Coccidiosis (E. bovis, E. zuernii); Neumonía bacterial (Haemophilus sp., Pasteurella sp.); Endometritis y Septicemia puerperal (E. coli, Staphylococcus sp., Streptococcus sp.); Mastitis (Staphylococcus sp., Streptococcus sp.); Retención de placenta, etc. Porcinos: Colibacilosis (E. coli); Rinitis Atrófica (Bordetella bronchiseptica), Toxoplasmosis (Toxoplasma gondii). Ovinos, caprinos, equinos, camélidos y caninos: enfermedades respiratorias, neumonías, bronquitis, cistitis y otras infecciones génitourinarias, septicemias, infecciones postparto y postoperatorias, pododermatitis, diarreas, enteritis, abscesos y heridas infectadas, afecciones tendinosas y articulares. Aves: Coccidiosis (E. tenella, E. necatrix, E. acervulina, E. maxima, E. brunetti), Coriza Infecciosa (Haemophilus gallinarum), Enfermedad Respiratoria Crónica CRD (Mycoplasma gallisepticum), Estafilococosis (Staphylococcus aureus), Pullorosis (Salmonella pullorum), Colibacilosis entre otros.

Dosis

Oral: disuelto en el agua de bebida, leche o con el alimento. Tratamiento de 3 a 5 días. Aves, conejos, cuyes: 30 a 50 g en 200 litros, 15 a 20 mg por kg de peso vivo. Bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos, equinos, caninos, felinos: 15 – 20 mg por kg de peso vivo. En el alimento: 300 a 500 g por tonelada de alimento. PERÍODO DE RETIRO: Aves de carne. bovinos de carne, ovinos: 10 días antes del sacrificio. Porcinos: 15 días antes del sacrificio. No administrar a lecheras ni ponedoras.

Presentaciones

Sobre 10 g, Bolsa 1 kg, Bolsa 500 g, Bolsa 50 g, Bolsa 100 g,

Vias Administración

Oral

Paises

Perú SENASA F.21.04.N.004

Clase ACTVET

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Sulfonamidas – trimetoprim

Web Site

http://biovetperu.com/wp/?page_id=203

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com