FLORFENIDROG®

Drogavet

Solución Inyectable



Composición

Florfenicol 30 g

Indicaciones

Está indicado para infecciones causadas por bacterias Gram positivas y Gram negativas, como Pasteurella spp., Haemophilus spp., Salmonella spp., Escherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Clostridium spp., micoplasma. Bovinos: Enfermedad respiratoria bovina, queratoconjuntivitis infecciosa bovina, diarreas, infecciones del tracto genital. Porcinos: Neumonía, complejo respiratorio porcino.

Dosis

Bovinos: 1 mL de FLOFENIDROG® / 15 kg p.v., por día, vía intramuscular, dos inyecciones con 48 horas de diferencia o 2 mL de FLORFENIDROG® / 15 kg p.v., por día (equivalente a 40 mg de florfenicol / kg p.v.). Porcinos: 1 mL de FLORFENIDROG® / 30 kg p.v., por día, cada 3 días, vía intramuscular.

Presentaciones

Frasco 500 mL, Frasco 250 mL, Frasco 100 mL, Frasco 50 mL, Frasco 20 mL, Frasco 10 mL,

Vias Administración

Parenteral Intramuscular

Paises

Panamá MIDA RF-5498-10
Perú SENASA F.03.01.N.1399

Clase ACTVET

QJ ANTIINFECTIVOS PARA USO SISTEMICO
QJ01 ANTIBACTERIANOS PARA USO SISTEMICO
QJ01B AMFENICOLES
QJ01BA Amfenicoles
QJ01BA90 florfenicol

Clases Farmacoterapeuticas

Antibacterianos (antibioticos)
Anfenicoles (derivados del cloranfenicol)

Web Site

http://www.laboratoriosdrogavet.com/producto/florfenidrog/

Copyright © 2026 Vademecumveterinario.com